

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

Нео-ангин®

Регистрационный номер:
П N013046/01

Торговое название: *нео-ангин®*

Группировочное название:
Амилметакрезол + Дихлорбензиловый спирт + [Левоментол]

Лекарственная форма:
таблетки для рассасывания

Состав:
1 таблетка для рассасывания содержит:

Активные вещества:	
дихлорбензиловый спирт	1,2 мг
амилметакрезол	0,6 мг
левоментол	5,9 мг

Вспомогательные вещества:
аниса звездчатого плодов масло, мяты перечной листьев масло, сахара, сиропа глюкозы, винная кислота, краситель пунцовый (Понсо 4R).

Описание:
круглые, слегка двояковыпуклые таблетки с шероховатой поверхностью красного цвета с характерным запахом. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев. Возможно появление белого налета.

Фармакологическая группа:
Антисептическое средство

Код АТХ:
R02AA20

Фармакологические свойства:
Комбинированный антисептический препарат для местного применения в полости рта и глотки. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов и грибов. В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике препарата *нео-ангин®* отсутствуют.

Показания к применению:
Профилактика и лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки (фарингиты, ларингиты, неосложненные формы ангины, стоматиты, гингивиты).

Противопоказания:
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Дети до 6 лет.

Способ применения и дозы:
Взрослым и детям старше 6 лет назначают по 1 таблетке каждые 2-3 часа. Максимальная суточная доза – 8 таблеток. Таблетки рассасывают до полного растворения.

Побочные действия:
Возможны аллергические реакции, диспепсия.

Передозировка:
Не описано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
Клинически значимого взаимодействия препарата *нео-ангин®* с лекарственными препаратами других групп не выявлено.



**Особые указания:**

При назначении препарата пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что 1 таблетка соответствует 0,22 XE

Форма выпуска:

Таблетки для рассасывания. По 8 или 12 таблеток в контурную ячейковую упаковку из ПВХ/Al фольги (блистер).

По 2 блистера по 8 таблеток или по 2 или 4 блистера по 12 таблеток вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.

Условия хранения:

В сухом месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

5 лет,

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек:

Без рецепта.

Производитель:

ДИВАФАРМА ГмбХ

Мотценер штр, 41

12277, Берлин, Германия

Тел. (030) 72007-266

Организация, уполномоченная принимать претензии и предоставлять дополнительную информацию о препарате на территории РФ:

ООО «ЭмСиЭл-фарма»

119019 Москва, Гоголевский бульвар, д. 17, стр. 1.

Тел.: (495) 790-87-19 , (495) 637-30-22

Нео-ангин®